

OPHRYS SANTONICA J.-M. MATHÉ & F. MELKI (ORCHIDACEAE) EN LA PROVINCIA DE SORIA

Javier GALINDO HERRERO * & Antonio SÁNCHEZ SERENA **

* c/ Cerro de la Carrasqueta 37 Portal 14 1°C 28035 Madrid galindo.fj@gmail.com

** c/ Egido 47 42169 Almarza (Soria). sanchez.serena@gmail.com

RESUMEN: Aportamos la primera cita provincial para Soria de *Ophrys santonica* (Orchidaceae), taxon que inicialmente fue descrito como endémico de Francia pero que recientemente también ha sido citado en escasas localizaciones del noreste de la península Ibérica. **Palabras clave:** *Ophrys santonica*, Orchidaceae, Soria (España).

SUMMARY: We provide the first citation for the Soria province of *Ophrys santonica* (Orchidaceae), a taxon initially described as a French endemic species, but which recently has also been spotted in a few localities on the NE of the Iberian Peninsula. **Key words:** *Ophrys santonica*, Orchidaceae, Soria (Spain).

Ophrys santonica J.-M. Mathé & F. Melki es un taxon del grupo de *O. scolopax* descrito de Francia (MATHÉ & MELKI 1994a, 1994b), de donde fue considerado inicialmente como especie endémica. Más recientemente se ha localizado también en España, en algunos puntos del interior de la mitad norte de la provincia de Castellón y del centro de la provincia de Barcelona; además, hay datos que sugieren su presencia en la provincia de Cuenca (ARNOLD, 2009; VILA, 2009). Datos posteriores a la elaboración del manuscrito para el género *Ophrys* en *Flora iberica* (ALDASORO & SÁEZ in AEDO & HERRERO, 2005).

Para las abreviaciones de los autores de este taxon se ha seguido lo propuesto en el IPNI (International Plant Names Index); para las restantes orquídeas citadas se siguen los criterios de *Flora iberica* (AEDO & HERRERO (Eds.), 2005).

La especie aludida muestra una floración tardía (óptimo en junio, llegando hasta mitad-segunda quincena de julio en

España), con flores relativamente pequeñas dentro del grupo y muchas veces con los bordes laterales del labelo, glabros y de color amarillo o, más raramente, marrón, bien visibles, especialmente hacia el apéndice, que es relativamente grande. Además, el lóbulo central del labelo suele tender a globoso y las gibosidades a veces están reducidas en mayor o menor grado.

Hemos localizado una población de esta especie en el noreste provincia de Soria (comunidad de Castilla y León), lo cual representa una notable ampliación de su área de distribución conocida en la península Ibérica.

Ophrys santonica J.-M. Mathé & F. Melki (= *O. scolopax* Cav. subsp. *santonica* (J.-M. Mathé & Melki) R. Engel & Quentin; *O. juliana* Kerguelén)

Hs, *SORIA: 30TWM2228 Herreros, vertiente norte de la Sierra de Cabrejas, camino del ferrocarril, 1135 m. 29-VI-2009 y 10-VII-2010, J. Galindo & H. Sánchez (figs. 1 y 2).

En 29-VI-2009 fueron localizados 4 pies con flores aún frescas, un poco mar-

chitas por la sequedad, y aún con algunos capullos. En 10-VII-2010 la floración iba algo más retrasada; encontramos 47 pies con flores frescas y capullos; algunas iniciaban ya la fructificación y otras habían sido polinizadas recientemente (polen en la cavidad estigmática). Por tanto, la población parece estar bien establecida y progresar. Ocupa un área de unos 150 m² de un total de 3 ha. en pastizal mesófilo, sobre substrato margoso carbonatado, llegando a encharcarse en época de lluvias, siendo la única especie del género en floración en ese momento, y acompañada en los alrededores de *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br., *G. odoratissima* (L.) Rich. y *Epipactis palustris* (L.) Crantz encontrándose éstas en plena floración. Tenemos noticias de que por parte de la Junta de Castilla y León se está estudiando la posibilidad de la creación de una micro-reserva de flora en la zona.

BIBLIOGRAFÍA

AEDO, C. & A. HERRERO (Eds.) (2005) *Flora iberica*, 21. Real Jardín Botánico, C.S.I.C., Madrid. 366 pp.

ARNOLD, J. E. (2009) Notes sobre el gènere *Ophrys* L. (Orchidaceae) a Catalunya i al País Valencià. *Acta Bot. Barc.* 52: 45-82, 139-143.

MATHÉ, J.-M. & F. MELKI (1994a) *Ophrys aestivalis*: une nouvelle espèce à floraison tardive dans le centre-ouest de la France. *Orchidophile* 112: 120-126.

MATHÉ, J.-M. & F. MELKI (1994b). *Ophrys santonica*: un nouveau nom valide pour *Ophrys aestivalis*. *Orchidophile* 113: 158-159.

VILA, J. (2009) Noves aportacions sobre la distribució d'alguns tàxons del gènere *Ophrys* L. (Orchidaceae) a Catalunya i al País Valencià. *Acta Bot. Barc.* 52: 83-88, 146-147.

(Recibido el 20-X-2010)



Fig. 1



Fig. 2